

23 Oct 2019

## enfermedades cerebro vasculares

- accidente isquémico síntomas, causas y tratamiento
- accidente isquémico

### Solución

#### accidente cerebro vascular isquémico:

un accidente isquémico transitorio es cuando se detiene el flujo de sangre a una parte del cerebro por un breve periodo de tiempo una persona tendrá síntomas similares a un accidente cerebrovascular hasta por 24 horas en la mayoría de los casos los síntomas duran entre 1 a 2 horas.

**síntomas:** los signos y síntomas del accidente cerebrovascular son los siguientes:

- **Dificultad para hablar y entender lo que otros están diciendo:** se puede experimentar confusión dificultad para articular las palabras o para entender lo se dice.

22 Oct 2021

## Alcohol

Para la mayoría de los adultos, el consumo moderado de alcohol probablemente no es peligroso. Sin embargo, cerca de 18 millones de adultos en Estados Unidos tienen trastorno por el consumo de alcohol. Esto quiere decir que sus hábitos de consumo causan angustia y daños. Este trastorno puede ser de leve a severo, dependiendo de los síntomas en ocasiones el tipo severo es llamado alcoholismo o dependencia del alcohol.

- **Ansias:** una fuerte necesidad de beber
- **Pérdida de control:** incapacidad para dejar de beber una vez que se comenzó
- **Estado emocional negativo:** sentirse ansioso e irritable cuando no se está bebiendo

Un atracón de alcohol consiste en beber tanto de una vez que el nivel de concentración de alcohol en la sangre es de **0.08%** o más para un hombre generalmente ocurre después de tomar 3 o más bebidas en unas pocas horas.

## Drogas y su clasificación

Los estimulantes aumentan la actividad en la rama simpática del sistema nervioso incrementando el gasto cardíaco, la tensión arterial.

A nivel conductual produce una elevación del humor un mayor de la sociabilidad.

• **cocaína:** es un poderoso estimulante que se obtiene de las hojas de la planta hay diferentes formas de consumo.

**Afetanina:** es un agente adrenérgico, sintético potente estimulante nervioso.

### • Drogas depresoras del sistema central:

son fármacos que incluyen sedantes, tranquilizantes y medicamentos hipnóticos entre los sedantes se encuentran principalmente los barbitúricos.

27 Oct 2019

## Trastornos alimenticios

Los trastornos alimenticios engloban varios ensermeñades crónicas y progresivas, de carácter psicosomático, se manifiestan a través de la conducta alimentaria y consisten en una complejidad de síntomas entre los que prevalece una alteración o distorsión de la auto imagen corporal.

### Orígenes:

Los trastornos alimenticios tienen su origen entre el siglo **XIV** y el siglo **XIX**, son descritas como conceptos modernos, por los psiquiatras de la época.

primer caso conocido fue en el siglo **XIV**, en el cual una Princesa llamada **Wilhegen Borhis**, no ingería ningún alimento con el propósito de que ningún hombre la deseara.

### Algunos trastornos:

- Anorexia
- Bulimia
- Ortorexia
- vigorexia
- permarexia
- megarexia
- Drunkorexia
- Potomanía
- Pica

## Causas:

Se desconoce la causa exacta de los trastornos alimenticios. Los investigadores creen que estas afecciones son causadas por una interacción compleja de factores, incluyendo genéticos, biológicos, conductuales, psicológicos y sociales.

## Síntomas:

- comer cantidades inusualmente grandes de alimentos en un periodo de 2 horas.
- comer incluso cuando está lleno o no tiene hambre.
- comer rápido durante los episodios de atracones.
- comer hasta que este incómodamente lleno.
- comer solo o en secreto para evitar la vergüenza.
- sentirse angustiada, avergonzada o culpable por su alimentación.
- Hacer dieta con frecuencia, posiblemente sin pérdida de peso.

29 Oct 2019

## enfermedades de transmisión sexual

son todas aquellas infecciones que se transmiten principalmente a través del contacto sexual, fundamentalmente durante las relaciones sexuales penetrativas de pene a lengua a vagina, ano, o cavidad oral.

### \* Virus del papiloma humano:

- Infección que provoca verrugas en varias partes del cuerpo según la cepa.
- Transmisión por contacto sexual.
- Si bien el tratamiento puede ayudar, pero esta enfermedad no tiene cura.

### \* infección por clamidia:

- Infección de transmisión sexual común que puede ser asintomática.
- flujo vaginal anormal que puede tener un fuerte olor.
- siempre se requieren análisis de laboratorio o estudios de diagnóstico por imágenes.

## \*Gonoreas:

- Infección bacteriana de transmisión sexual que si no se trata puede ser causa de infertilidad.
- Los chequeos frecuentes pueden ayudar a detectar casos en los que hay una infección que no presenta síntomas.
- Por relaciones sexuales vaginales, anales y orales sin protección.

## \*Sifilis:

- Infección bacteriana, generalmente de transmisión sexual, que comienza con una llaga indolora.
- La sifilis se desarrolla en etapas y los síntomas pueden variar en cada una de ellas.
- Subagudo: se curan en cuestión de meses y requiere diagnóstico médico.

## \*Sida:

- El VIH ocasiona el sida y además interfiere con la capacidad del cuerpo de combatir infecciones.
- El virus se puede transmitir mediante el contacto con la sangre, el semen o los fluidos vaginales infectados.

## metodos de Planificacion

metodos de planificacion familiar se refiere habitualmente al conjunto de practicas orientadas por lo general al control de la reproduccion sexual al mediante el uso de metodos anticonceptivos en la practica de acto sexual.

- La Planificacion familiar se realiza a traves de metodos y productos anticonceptivos que buscan evitar un embarazo no deseado.
- Las parejas que mantienen relaciones sexuales deben utilizar metodos anticonceptivos de forma adecuada y cada vez que mantengan relaciones sexuales para evitar el embarazo.
- siempre que se desee asesoramiento sobre los diferentes metodos anticonceptivos debera dirigirse a su medico de atencion primaria, quien le resolvera numerosas dudas y le remitira al ginecologo en aquellos casos que estime oportuno.

## La depresión

Los trastornos afectivos constituyen un grupo de enfermedades caracterizados por una sintomatología afectiva básica y común a todos ellos (tristeza, decaimiento, desilusión, incapacidad para el disfrute), pero diferenciándose por la duración, gravedad y evolución.

- **Depresión subclínica:** es aquella depresión que puede pasar prácticamente inadvertida, porque no se detecta la presencia de ánimo deprimido, ni la incapacidad para disfrutar de las cosas.

- **Trastorno distónico:** es un tipo de depresión crónica, en la que los síntomas se manifiestan de forma permanente durante un periodo de tiempo prolongado.

Act de exposiciones  
Sofía Torres 11°