

1) ¿Por qué es importante, para analizar el movimiento de un cuerpo, definir primero un sistema de referencia?

Porque esto es la base para poder determinar su movimiento, dirección y sentido,

2) Puede un cuerpo moverse y tener una velocidad igual a 0 m/s? Da un ejemplo.

1. Depende del eje de referencia que veamos o tengamos en cuenta  
ej: la tierra está en constante movimiento (girando) Un carro está estacionado, pero no está quieto, en realidad se está moviendo junto con la tierra

e) Da un ejemplo de un movimiento en el que la velocidad y la rapidez tengan el mismo valor.

Por ejemplo cuando un balón se mueve de una forma rectilínea durante un tiempo de 7 segundos y recorre 1 m/s

2 Escribe V, si el enunciado es verdadero o F, si es falso.

- Cuando un cuerpo se mueve, el valor de la distancia recorrida es diferente de cero.
- El desplazamiento de un cuerpo no puede ser negativo.
- En el movimiento rectilíneo uniforme el cuerpo recorre distancias diferentes en intervalos de tiempos iguales.
- Un cuerpo que se mueve cambiando su velocidad experimenta una aceleración.
- En una gráfica de velocidad-tiempo en un movimiento uniforme acelerado, la pendiente representa la aceleración del movimiento.

3 Un vehículo viaja, en una sola dirección, con una rapidez media de 40 km/h durante los primeros 15 minutos de su recorrido y de 30 km/h durante los siguientes 20 minutos. Calcular:

- a) La distancia total recorrida.
- b) La rapidez media.

Sigue las pistas y completa la solución

a) La distancia total recorrida es la suma de las distancias recorridas. Como:

$$v = \frac{\text{Distancia recorrida}}{\text{Tiempo empleado}} = \frac{d}{t}$$

Para el primer recorrido,  $d_1 = v \cdot t$

$$d_1 = 1.11 \text{ m/seg} \cdot 900 \text{ seg} = 9.999 \text{ m}$$

Para el primer recorrido,  $d_2 = v \cdot t$

$$d_2 = 8.33 \text{ m/seg} \cdot 1.200 \text{ seg} = 9.996 \text{ m}$$

Distancia total recorrida:  $d_1 + d_2$

$$9.999 + 9.996 = 19.995 \text{ m}$$

b) Para calcular la rapidez media tenemos:

$$v = \frac{\text{Distancia recorrida}}{\text{Tiempo empleado}} = \frac{d}{t}$$

$$v = \frac{19.995 \text{ m}}{2.100 \text{ seg}} = 9.52 \text{ m/seg}$$

La rapidez media del vehículo durante el recorrido es  $9.52 \text{ m/seg}$

4 Un auto lleva una rapidez constante de  $15 \text{ m/s}$  y recorre una distancia de  $33 \text{ m}$  ¿Cuánto tiempo, se demoró en recorrer esta distancia?

$$v = 15 \text{ m/s}$$

$$d = 33 \text{ m}$$

$$t = ?$$

$$t = \frac{d}{v} = \frac{33 \text{ m}}{15 \frac{\text{m}}{\text{s}}} = 2,2$$

$$t = 2,2 \text{ s}$$

5 La velocidad de sonido es de  $330 \text{ m/s}$  y la de la luz es de  $300000 \text{ km/s}$ . Se produce un relámpago a  $50 \text{ km}$  de un observador.

a) ¿Qué recibe primero el observador, la luz o el sonido?

b) ¿Con qué diferencia de tiempo los registra?

a = Como la velocidad de la luz es mucho mayor entonces, la luz llegará primero al observador y luego el sonido

$$v_{\text{luz}} = 300.000 \text{ km/s} = 300.000.000 \text{ m/s}$$

$$v_{\text{sonido}} = 330 \text{ m/s}$$